

"心梗"来势凶险,别拿作息不当回事


医生提醒:不熬夜、戒烟戒酒,养成健康的生活方式

火 本报记者 胡师睿

在单位一坐就是一天,常年三餐不定时,隔三差五加夜班,为了完成方案赶进度通宵达旦,这是 不少"工作狂"的写照。

这种看似"勤奋"的工作状态,其实正严重透支着身体。近日,正值事业发展期年仅34岁的歌 手覃桢突发心梗猝死,途牛旅游网预订中心副总经理李波也因突发心肌梗塞离世,年仅44岁。

看似少见的心梗,其实危险程度堪比癌症。心梗一般指急性心肌梗死,是冠状动脉急性、持续 性缺血缺氧所引起的心肌坏死。因为心梗发病突然,来势凶险,致死率极高,有效治疗时间极短,而 发病范围广,年龄跨度大,尤其需要我们注意。



35岁的程华是下沙一家企业的部门经理, 平时工作比较忙,晚上加班更是家常便饭。上 个星期二晚上,由于赶一份客户急要的策划案, 程华赶工到了深夜十一点多。

好不容易完成了单位里的任务,好朋友又 来了电话,邀他上酒桌喝酒,大吃之后,红酒白 酒下肚。凌晨两三点,程华就觉得胃部一阵阵 疼痛,当下就冒部不适,扶着路边的栏杆吐了好 一会,同时感觉胸痛、胸闷。

躺下后,他也难以入睡,"就感觉心脏不停 地砰砰砰加速跳起来,完全没有睡意。"送他回 来的朋友见此情形也吓坏了,赶忙将他送去了 邵逸夫医院下沙院区。经过心电图提示,正是 心梗惹的祸。

还有一位陈先生则在下沙一家互联网公司

就职,一天工作十几个小时,已经是常态。早上 八点半起床,送孩子上学,九点半到达公司后, 就是开会、写方案。中午忙起来,常常一个面 包,几块饼干就对付了。晚上回到家又是十点 多了,这时候叫上份夜宵,是一天里吃得最舒坦 的时候。这样的工作状态,陈先生告诉记者,一 个字,累。最近的公司统一体检中,自己也被查 出有冠心病的风险,要注意突发心梗。

在邵逸夫医院的心内科门诊部,记者了解 到,当下心梗的年轻化越来越明显,原来专属于 五六十岁大伯大妈们的毛病,现在在三四十岁 的人身上也时有发生,甚至不乏90后群体。按 照从浙大一院、浙医二院、邵逸夫医院、浙江医 院、省人民医院等几家大医院了解到的数据,目 前接诊最年轻的心梗病人仅有22岁。

心脏问题马虎不得 一定要避免熬夜

心梗的发作主要是因为什么?

在邵逸夫医院心内科的门诊部,傅医生讲 解道:"最主要的就是生活方式太不健康,吃的 东西太油腻,脂肪含量过高,缺乏运动,抽烟喝 酒,工作压力大,日夜颠倒……这些都是诱发心 梗的原因。同时,如果患者还有高血压、糖尿 病、血脂高等情况,更容易诱发心梗。"

如果说有什么简单易懂的忠告,那就是千 万别熬夜。

不熬夜,这是最容易做到的,每天习惯性

地晚睡不睡,对于心脏负担其实很大。如果 有点毅力的话,最好还要戒烟戒酒,这些不 良生活方式,都是突发心梗的诱因之一。多 锻炼,控制体重也对预防心脏疾病有很大帮

同时,也要对身上莫名出现的头痛、胸痛、 乏力、气短引起重视,"许多年轻人都不把这些 状况当回事,以为只是最近身体太累了,其实这 些都是身体在给你提醒。"面对这些情况,千万 别抱着忍忍就过去了的态度。

健康小贴士

预防心梗注意这些

1.有高血压、糖尿病、高脂血症等基础疾病 的人尽量呆在温暖的环境,少出门。

2.既往有心脏疾病,尤其是心力衰竭的病 人注意保暖,尽量避免感冒、肺部感染等,以免 加重心衰病情。

3.冠心病急性发作在早上6-10点比较多 见,这个时间段请多饮水,降低血凝度,避免寒

4.心绞痛、心梗的症状不一定表现为胸痛, 如有面颊部、颈部酸胀感持续时间大于30分钟 以上不消除,或者持续恶心呕吐的,要及时去看 医生,这也可能是心脏疾病。

5.一旦发生心梗想尽办法及时送院。如 在发病3小时内及时得到救治,预后会比较

6.冠心病患者,在等待救援时可服用速效 救心丸4-5颗或硝酸甘油片1片。

7.控制情绪、注重心理平衡。 应尽量避免 过度紧张、激动、焦虑、抑郁等不良情绪,保持良 好的心态。



这些批次的中药饮片 被测出不合格 其中大部分是板蓝根

近期,全国有54批次中药饮片被检出 不合格,其中28批次是板蓝根。记者了解 到,目前,食药监部门已要求企业暂停销售 使用、召回产品,并进行整改。

据国家食药监局通告,根据通告,标示 为上海华鹰药业有限公司、安徽省金芙蓉 中药饮片有限公司等企业生产的28批次 板蓝根不合格。不合格项目包括性状、含 量测定、二氧化硫残留量等。

标示为安庆华氏中药饮片有限公司、 山东鄄城志远中药饮片有限公司等企业生 产的18批次当归不合格。不合格项目包 括性状、鉴别、二氧化硫残留量等。

标示为广西贵港市绿之源种养发展有 限公司中药饮片厂、云南新世纪中药饮片 有限公司等企业生产的7批次厚朴不合 格。不合格项目均为含量测定。

标示为北京鹤延龄药业发展有限公司 生产的1批次全蝎不合格。不合格项目为 浸出物。

其中,如果二氧化硫在一定量范围内, 对大多数人来说危害不大,但食用二氧化 硫超标的食品药物,会对呼吸道、食道、胃 黏膜有刺激作用,会引起胃肠道代谢紊乱, 甚至有致癌风险,而哮喘患者、对二氧化硫 过敏者影响会更加明显。

目前,食药监部门已要求企业暂停销 售使用、召回产品,并进行整改。同时,国 家食药监总局要求各地食药监部门对违法 行为进行立案调查,在一个月内做出处罚 决定。如确属标示生产企业生产的,由相 关省(区、市)食品药品监督管理局对生产 企业从重处罚。

火 本报记者 胡师睿