

春天的小野花, 别样的美丽

本刊综合整理

看过了梯田式的油菜花、樱花大道,很少有人会注意到山上脚边不起眼的小野花。小时候,就见过路边遍地的小野花,叫都叫不出名字,都觉得很好看。那个时候,就想采几朵回家,插在花瓶里,还能观赏几天。后来,渐渐懂得万物皆有本名,小野花野草也有被歌颂的意义,拍下照片,让其在大自然自然生长,就是最爱的表现。

农村里、田埂上、田野间,开满了不知名的小野花,它们是小小的生命,默默地绽放美丽,为这个春天增添一份色彩。



点地梅

【形态特征】:一年生或二年生草本,全株被细柔毛。须根纤细。

【生长习性】:喜湿润、温暖、向阳环境和肥沃土壤,常生于山野草地或路旁。种子能自播繁殖。

【植物分布】:分布极广,我国各地均有分布,俄罗斯、朝鲜、日本、菲律宾、印度、越南、柬埔寨、老挝也有分布。

【园林用途】:点地梅植株低矮,叶丛生,平铺地面,适宜岩石园栽植及灌木丛旁作地被材料。全草可药用。

【繁殖培育】:用播种繁殖。

【其他用途】:全草入药,能清热解毒、消肿止痛。主治扁桃体炎、咽喉炎、口腔炎、急性结膜炎、跌打损伤。



打碗花

【别名】小旋花、面根藤、狗儿蔓、葛秧、斧子苗

【分类】旋花科,打碗花属

【形态】多年生草质藤本。主根(一说根状茎,但未见分节)较长,横走。茎细弱,长0.5-2m,匍匐或攀援。叶互生,叶片三角状戟形或三角状卵形,侧裂片展开,常再2裂。花萼外有2片大苞片,卵圆形;花蕾幼时完全

包藏于内。萼片5,宿存。花冠漏斗形(喇叭状),粉红色或白色,口近圆形微呈五角形。与同科其它常见种相比花较小,喉部近白色。子房上位,柱头线形2裂。蒴果,在我国大部分地区不结果,以根扩展繁殖。

【分布】我国各地广泛分布,为田间、野地常见杂草。

【用途】嫩茎叶可作蔬菜。



狗娃花

【形态特征】茎从基部分枝,直立或斜生,具毛和腺点,株高20-60cm。叶互生无柄。叶片条形、长圆状披针形至倒披针形,两面或背面被毛。头状花序单生在枝端,有的排列成伞房状;具2-3层总苞片,边花浅蓝紫色舌状,心花黄色筒状,5裂,其中1裂片长。瘦果长圆形扁平,有毛,毛上有腺点;冠毛白色至浅红褐色。

【性味归经】苦,凉。

【功能主治】解毒消肿。用于疮肿,蛇咬伤。

【用法用量】外用适量,捣烂敷患处。



角茴香

【异名】咽喉草、麦黄草、黄花草、雪里青、野茴香

【来源】为罂粟科植物细叶角茴香的根、全草。

【植物形态】细叶角茴香一年生草本,高20-40厘米。茎多数,上部分歧。

基生叶12-18枚,长1.5-9厘米;叶片有白粉,轮廓倒披针形;羽状全裂,1回裂片2-5对,约3回细裂,小裂片条形,宽约0.3毫米,先端尖;茎生叶小,无柄,裂片丝状。



米口袋

【形态特征】米口袋多年生草本,高4-20厘米,全株被白色长绵毛,果期后毛渐稀少。主根圆锥形或圆柱形,粗壮,不分歧或稍分歧,上端具短缩的茎或根状茎。

【分布】生于向阳草地、干山坡、沙质地、草甸草原或路旁等处。分布于我国黑龙江省、吉林省及华北、西北、华东、中南,朝鲜、俄罗斯(西伯利亚及远东地区)也有分布。

【功能主治】春季采收全草入药,煎服主治各种化脓性炎症、痈肿、疔疮(常与蒲公英配用)、高热烦躁、黄疸、肠炎、痢疾等。并可作饲料。